



Clomate®

Nettó tartalom:

1 Liter e

Reziduális herbicid mikrokapszulás, vizes szuszpenzió (CS) kiszerelésben.
Őszi káposztarepce és burgonyában található magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények ellen.

Forgalomba hozatali engedély száma: 04.2/2761-1/2015 NÉBIH

Hatóanyag: Klomazon 360 g/l (30,3% w/w)

Forgalmazási kategória: I

A készítmény p.o. LD50 értéke (patkányon): > 2000 mg/ttkg

A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként való szállítás szükséges.

Az emberi egészség és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében be kell tartani a használati utasítás előírásait.

Különleges S-mondatok

SP1 A növényvédő szerrel vagy annak csomagolóeszközével ne szennyezze a vizeket! (A berendezést vagy annak részeit ne tisztítsa felszíni vizek közelében! Kerülje a gazdaságban vagy az utakon lévő vízfelvezetőkön keresztül való szennyeződést!)

Spe3 A vízi szervezetek védelme érdekében a felszíni vizektől 5 m távolságban tartson meg egy nem permetezett biztonsági övezetet!

A nem-cél növények védelme érdekében a nem mezőgazdasági földterületől 5 m távolságban tartson meg egy kezeletlen biztonsági övezetet!

Egyéb környezetvédelmi előírások:

Az ivóvízbázisok belső védőterületén felhasználni tilos, külső védőterületen és a hidrogeológiai védőövezeten belül külön engedélyezéstől függően használható!

Légi kijuttatás: nem engedélyezett

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette!

Mérgezőskor, vagy annak gyanújakor az Egészségügyi Toxikológiai

Tájékoztató Szolgálat díjmentesen, 24 órán keresztül hívható zöld száma: 06 80 201 199

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újrafelhasználása tilos!

Gyártási szám: **a csomagolóanyag**on

Gyártási idő: **a csomagolóanyag**on

Eltarthatóság: Eredeti, zárt csomagolásban, száraz, hűvös helyen, szabályos növényvédő szer raktárban 2 év.

Növényvédő szer gyártója és az engedélyokirat tulajdonosa:

Albaugh TKI d.o.o.

Grajski trg 21, 2327 Rače, Szlovénia, Tel.: +386 2 6090 21



Continental Hungary Kft.

Forgalmazó: VETCO Continental Hungary Kft.

2100 Gödöllő, Szabadság ut 60, www.vetco.hu, Tel.: +36 30 243 3155

CSEBER Non-profit Kft. növényvédő szerrel szennyezett csomagolóanyag gyűjtőhelyeinek listája megtalálható a www.cseber.hu/gyujtohelyek-listaja Tel.: +36 1 340 5411



HASZNÁLATI UTASÍTÁS

KIZÁRÓLAG MEZŐGAZDASÁGI HERBICIDKÉNT TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA.

| Kultúra | Károsító | A kijuttatáshoz szükséges | | A kezelés ideje (fenológiai állapot szerint) |
|--------------------|-------------------------------------------|---------------------------|------------|----------------------------------------------|
| | | szer (l/ha) | víz (l/ha) | |
| őszi káposztarepce | magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | 0,33 | 200-300 | vetés után, kelés előtt (BBCH 00-05) |
| burgonya | magról kelő egy- és kétszikű gyomnövények | 0,25 | | ültetés után, kelés előtt (BBCH 00-08) |

Előírt növényvédelmi technológia:

A készítmény egy vegetációs időszakban csak egy alkalommal használható!

Őszi káposztarepce kultúrában a készítményt vetés után, kelés előtt (preemergensen) kell kijuttatni 0,33 l/ha dózisban, jól elmunkált aprómorzszás talajfelszínre. A kezelést a vetés után minél hamarabb el kell végezni, legkésőbb a vetés után 5 nappal. A repce magvakat legalább 2 cm-es talajrétegnek kell takarnia a megfelelő szelektivitás érdekében.

Burgonyában a készítményt a végleges bakhátak kialakítása után kell kipermetezni, a kultúrnövény kelése előtt 0,25 l/ha dózisban, a kezelést követően talajmunkát ne végezzünk. A burgonya gumókat legalább 2 cm-es talajrétegnek kell takarnia a megfelelő szelektivitás érdekében.

A készítmény a gyomirtási spektrum szélesítése céljából kombinálható, az érintett kultúrákban engedélyezett készítmények engedélyokiratukban meghatározott dózisával. Kombináció esetén mindig figyelembe kell venni a kombinációs partner alkalmazás-technológiai előírásait. Burgonyában a készítmény kombinációban való kijuttatása javasolt a gyomosodástól függően.

A készítménnyel kezelt kultúrnövény betakarítása után legalább 15 cm mélységű szántást követően a következő kultúrák vethetők utóveteményként: kalászosok, őszi káposztarepce, lóbab, burgonya, takarmányborsó, kukorica, len, cukorrépa és tarlórépa.

Az őszi káposztarepce kipusztulása esetén legalább 25 cm mélységű szántást követően a kezelés után legalább 6 hét eltelte után őszi kalászosok, lóbab, takarmányborsó és burgonya vethető, míg legalább 7 hónap eltelte után lehet vetni tavaszi kalászosokat, kukoricát, vöröshagymát, sárgarépat, lent, és tarlórépat. A burgonya kipusztulása esetén legalább 25 cm mélységű szántást követően a kezelés után legalább 6 hét eltelte után vethető takarmányborsó, lóbab, burgonya, sárgarépa, cukorrépa, vöröshagyma, len és tarlórépa, míg legalább 9 hét eltelte után lehet vetni kukoricát és zöldbabot.

Külön figyelmet kell fordítani arra, hogy a permetlé ne sodródjon el a kezelt területen kívülre. Kerülni kell a permetlé szomszédos kultúrákra, különösen olyan területekre történő elsodródását, ahová érzékeny növényeket (kalászosok, cukorrépa) vetnek.

A klomazon hatóanyag a HRAC „F3” karotinoid bioszintézist gátló herbicidcsoporton belül

izoxazolidinon hatóanyagcsoportba sorolható.

Munkaegészségügyi óvórendszabályok:

Egyéni védőfelszerelés

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------|
| előkészítőknek | védőkesztyű |
| kijuttatóknak | védőkesztyű (zárt, túlnyomásos gépkabinban nem szükséges) |

Mérgezéskor, allergiás megbetegedés esetén, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Elsősegélynyújtás, terápia

Bőrrel való érintkezés esetén a bőrt bő vízzel, szappannal meg kell tisztítani. *Szembe jutás esetén* a szemet azonnal, bő vízzel, legalább 15-20 percig öblögetni. *Lenyelés esetén*, ha a sérült tudatánál van, egy két pohár vízzel itatni, orvosi ellátást biztosítani.

Terápia: tüneti-megfigyelő kezelés.

Ellenanyag: specifikus antitóduma nincs.

Várakozási idők:

Munkaegészségügyi várakozási idő: 0 nap

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| kultúra | várakozási idő (nap) |
| őszi káposztarepce | előírás szerinti felhasználás esetén nem szükséges |
| burgonya | |

A SZÁLLÍTÁS, ÉRTÉKESÍTÉS ÉS HASZNÁLAT FELTÉTELEI

Számos tényező lehet hatással vagy befolyással a termékkel végzett tevékenységre, a teljesség igénye nélkül: időjárási és talajviszonyok, a növények köre, a kezelés időzítése, a vízmennyiség, az alkalmazás gyakorisága, a permetezési technikák, a vetésforgó, regionális tényezők és a hatóanyagra rezisztens törzsek megjelenése és fejlődése. Bizonyos körülmények között a hatás módosulása vagy növénykárosodás bekövetkezhet. A gyártó vagy beszállító nem tud felelősséget vállalni ezekért a körülményekért. Minden, általunk beszállított termék magas minőségű, és tudomásunk szerint megfelel arra a célra, amelyre kifejezetten szállítjuk őket: de nem tudjuk ellenőrizni azok keverését, felhasználását vagy alkalmazását, amely tényezők a termék teljesítményére hatással lehetnek, ezért kizárunk minden feltételt és jogszabály által vagy más módon előírt jótállást a termék minőségére vagy adott célra való megfelelésére vonatkozóan és nem vállalunk felelősséget bármely károsodásért vagy sérülésért, amely valamilyen formában a termékek tárolásából, kezeléséből, alkalmazásából vagy felhasználásából ered. Ezekben a feltételeken stábunk, ügynőink vagy termékeink vizonteladói nem tudnak változtatni attól függetlenül, hogy közreműködnek-e/felügyelik-e vagy sem ezen termékek használatát.